

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 治療レジメン名：    | 胃-1 ハーセプチン+SOX | 総投与時間：約3時間     |
| 申請医：竹内 伸司Dr | 催吐性リスク：中等度     | 最新登録日：2021年 8月 |

| 薬剤名   | 投与方法                      | 投与量                      | 投与日                   | クール |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|----------|------|--------|----------|-------|-------------|---------------|--------------|-------|----------|-------|
| オキサリプラチン(L-OHP)   | div                       | 100mg/m <sup>2</sup>     | D1                    | 3週間 |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| ハーセプチン  | div                       | 初回 8mg/kg<br>2回目～ 6mg/kg | D1                    |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| S-1：D1-D14<br>1日2回、朝夕食後に服用  |                           |                          |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面积(m<sup>2</sup>)</th> <th>1回用量(錠数)</th> <th>1日錠数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25未満</td> <td>40mg(2錠)</td> <td>4錠/分2</td> </tr> <tr> <td>1.25以上1.5未満</td> <td>50mg(2 or 3錠)</td> <td>5錠/分2(3-0-2)</td> </tr> <tr> <td>1.5以上</td> <td>60mg(3錠)</td> <td>6錠/分2</td> </tr> </tbody> </table> |                           |                          | 体表面积(m <sup>2</sup> ) |     | 1回用量(錠数) | 1日錠数 | 1.25未満 | 40mg(2錠) | 4錠/分2 | 1.25以上1.5未満 | 50mg(2 or 3錠) | 5錠/分2(3-0-2) | 1.5以上 | 60mg(3錠) | 6錠/分2 |
| 体表面积(m <sup>2</sup> )   | 1回用量(錠数)                  | 1日錠数                     |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| 1.25未満  | 40mg(2錠)                  | 4錠/分2                    |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| 1.25以上1.5未満   | 50mg(2 or 3錠)             | 5錠/分2(3-0-2)             |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| 1.5以上   | 60mg(3錠)                  | 6錠/分2                    |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |
| 対象(適応癌種)  | HER2過剰発現が確認された切除不能進行・再発胃癌 |                          |                       |     |          |      |        |          |       |             |               |              |       |          |       |

| 薬品名【投与量】  | 投与方法               | 投与速度  | 標準投与量                    | 計算量                     | 投与日                   |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
|---|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|--------|----------|-------|-------------|---------------|--------------|-------|----------|-------|--|
| Rp1<br>デキサート 16.5mg(適宜減量)<br>グラニセトロン 1A<br>5%ブドウ糖 100mL       | div<br>(ケモ<br>セーフ) | 250<br>mL/hr  |                          |                         | D1                    |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| Rp2<br>オキサリプラチン【 mg/body】<br>5%ブドウ糖 250mL                     |                    | 125<br>mL/hr  |                          |                         |                       | 100<br>mg/m <sup>2</sup> | mg/body |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| Rp3<br>生食 50mL  |                    | 500<br>mL/hr  |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| Rp4<br>ハーセプチン【初回 mg/body】<br>ハーセプチン【2回目～ mg/body】<br>生食 250mL |                    | 500<br>(初回170)<br>mL/hr   | 初回 8mg/kg<br>2回目～ 6mg/kg | 初回：<br>2回目～：<br>mg/body |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| Rp5<br>生食 50mL  |                    | 500<br>mL/hr  |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| Rp6<br>エスワンタイホウ(20)【】錠/分2<br>(-0-)<br>朝・夕食後                   | 1日2回、朝夕食後に服用       |   |                          |                         | D1-14                 |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
|   |                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面积(m<sup>2</sup>)</th> <th>1回用量(錠数)</th> <th>1日錠数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25未満</td> <td>40mg(2錠)</td> <td>4錠/分2</td> </tr> <tr> <td>1.25以上1.5未満</td> <td>50mg(2 or 3錠)</td> <td>5錠/分2(3-0-2)</td> </tr> <tr> <td>1.5以上</td> <td>60mg(3錠)</td> <td>6錠/分2</td> </tr> </tbody> </table> |                          |                         | 体表面积(m <sup>2</sup> ) | 1回用量(錠数)                 | 1日錠数    | 1.25未満 | 40mg(2錠) | 4錠/分2 | 1.25以上1.5未満 | 50mg(2 or 3錠) | 5錠/分2(3-0-2) | 1.5以上 | 60mg(3錠) | 6錠/分2 |  |
| 体表面积(m <sup>2</sup> )   | 1回用量(錠数)           | 1日錠数  |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| 1.25未満  | 40mg(2錠)           | 4錠/分2   |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| 1.25以上1.5未満   | 50mg(2 or 3錠)      | 5錠/分2(3-0-2)  |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |
| 1.5以上   | 60mg(3錠)           | 6錠/分2   |                          |                         |                       |                          |         |        |          |       |             |               |              |       |          |       |  |