

# 化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)  
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

|                |              |                  |
|----------------|--------------|------------------|
| 治療レジメン名 :      | 胃-8 SOX      | 総投与時間 : 約2.5時間   |
| 申請医 : 中島 日出夫Dr | 催吐性リスク : 中等度 | 最新登録日 : 2021年 8月 |

|          | 薬剤名                   | 投与方法          | 投与量                  | 投与日 | クール |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|-----|
| /        | オキサリプラチン(L-OHP)       | div           | 100mg/m <sup>2</sup> | D1  | 3週間 |
|          | S-1 : D1-D14          |               |                      |     |     |
|          | 1日2回、朝夕食後に服用          |               |                      |     |     |
|          | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 1回用量(錠数)      | 1日錠数                 |     |     |
|          | 1.25未満                | 40mg(2錠)      | 4錠/分2                |     |     |
|          | 1.25以上1.5未満           | 50mg(2 or 3錠) | 5錠/分2(3-0-2)         |     |     |
|          | 1.5以上                 | 60mg(3錠)      | 6錠/分2                |     |     |
| 対象(適応癌種) | ①大腸癌 ②胃癌              |               |                      |     |     |

|     | 薬品名 【 投与量 】                                      | 投与方法               | 投与速度         | 標準投与量                    | 計算量     | 投与日 |
|-----|--|--------------------|--------------|--------------------------|---------|-----|
| Rp1 | デキサート 16.5mg(適宜減量)<br>グラニセトロン 1A<br>5%ブドウ糖 100mL | div<br>(ケモ<br>セーフ) | 250<br>mL/hr | /                        |         | D1  |
| Rp2 | オキサリプラチン【 mg/body】<br>5%ブドウ糖 250mL               |                    | 125<br>mL/hr | 130<br>mg/m <sup>2</sup> | mg/body |     |
| Rp3 | 5%ブドウ糖 50mL                                      |                    | 500<br>mL/hr | /                        |         |     |
| Rp4 | エスワンタイホウ(20) 【 】錠/分2<br>( - 0 - )朝・夕食後           | 1日2回、朝夕食後に服用       |              |                          | D1-14   |     |
|     | 体表面積(m <sup>2</sup> )                            | 1回用量(錠数)           | 1日錠数         |                          |         |     |
|     | 1.25未満   | 40mg(2錠)           | 4錠/分2        |                          |         |     |
|     | 1.25以上1.5未満                                      | 50mg(2 or 3錠)      | 5錠/分2(3-0-2) |                          |         |     |
|     | 1.5以上  | 60mg(3錠)           | 6錠/分2        |                          |         |     |