

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	胃-15 S-1/DOC	総投与時間：約90分
申請医：谷本 梓Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
S-1：D1-D14	1日2回、朝夕食後に服用			3週間
	体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(錠数)	1日錠数	
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2	
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)	
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
ドセタキセル(DOC)	div	40mg/m <sup>2</sup>	D1	
対象(適応癌種)	胃がんの術後補助化学療法			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) シメチジン注 1A(適宜追加) ポララミン注 1A(適宜追加) 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ドセタキセル【           mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			
Rp4	エスワン「タイホウ(20)【   】錠/分2 ( - 0 - ) 朝・夕食後	1日2回、朝夕食後に服用			D1-14	
	体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(錠数)	1日錠数			
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2			
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)			
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2			