

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	脳腫瘍-3 テモダール	総投与時間：約2時間
申請医：黒田 英一Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	テモダール	div	150mg/m <sup>2</sup> (2クール目以降200mg/m <sup>2</sup> へ増量可)	D1-5	4週間
対象(適応癌種)	悪性神経膠腫				
コメント	放射線照射との併用の場合、75mg/m <sup>2</sup> として1日1回42日間投与し、4週間休薬する。				

治療予定期間：	年 月 日 より	の間	薬剤師	薬剤師
処方医師：	適応癌種：			
患者ID：	備考：	身長： cm	体表面積：	
患者氏名：		体重： kg	m <sup>2</sup>	

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量 mg/body	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr	150mg/m <sup>2</sup> (2クール目以降200mg/m <sup>2</sup> へ増量可)		D1-5
Rp2	テモダール【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 250mL) ※生食250mLからテモダールの必要量と同じ生食を抜き取る。 ※1バイアル(100mg)当たり注射用水41mLで調製する(テモダール2.5mg/mL)。		167 mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	mg/body		