

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-2 アバスチン + SOX	総投与時間：約3-4.5時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール										
/	アバスチン	div	7.5mg/kg	D1	3週間										
	オキサリプラチン(L-OHP)		130mg/m ²												
	S-1 : D1-D14			1日2回、朝夕食後に服用											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面积(m²)</th> <th>1回用量(錠数)</th> <th>1日錠数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25未満</td> <td>40mg(2錠)</td> <td>4錠/分2</td> </tr> <tr> <td>1.25以上1.5未満</td> <td>50mg(2 or 3錠)</td> <td>5錠/分2(3-0-2)</td> </tr> <tr> <td>1.5以上</td> <td>60mg(3錠)</td> <td>6錠/分2</td> </tr> </tbody> </table>		体表面积(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)	1.5以上
体表面积(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数													
1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2													
1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)													
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2													
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌														

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日												
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモ セーフ)	250 mL/hr	/		D1												
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	7.5 mg/kg	mg/body													
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	/														
Rp4	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		125 mL/hr	130 mg/m ²	mg/body													
Rp5	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr	/														
Rp6	エスワンタイホウ(20)【 錠/分2 (- 0 -)朝・夕食後	1日2回、朝夕食後に服用			D1-14													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面积(m²)</th> <th>1回用量(錠数)</th> <th>1日錠数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25未満</td> <td>40mg(2錠)</td> <td>4錠/分2</td> </tr> <tr> <td>1.25以上1.5未満</td> <td>50mg(2 or 3錠)</td> <td>5錠/分2(3-0-2)</td> </tr> <tr> <td>1.5以上</td> <td>60mg(3錠)</td> <td>6錠/分2</td> </tr> </tbody> </table>			体表面积(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
体表面积(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数																
1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2																
1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)																
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2																