

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-7 アバステン + modified-FOLFOXIRI (維持)	総投与時間：約3時間 + 46時間
申請医：谷本 梓Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバステン	div	5mg/kg	D1	2週間
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m ²		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m ²	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜減量) 生食 100mL	div (ルート三活)	250 mL/hr			D1
Rp2	アバステン【 mg】 生食 100mL		200mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500mL/hr			
Rp4	レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		125 mL/hr			
Rp5	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m ²	mg/body	