

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| 治療レジメン名： | 大腸-15 アービタックス | 総投与時間：約2.5-3.5時間 |
| 申請医：中島 日出夫Dr | 催吐性リスク：最小度 | 最新登録日：2021年 8月 |

| | 薬剤名 | 投与方法 | 投与量 | 投与日 | クール |
|----------|----------------------------|------|--|-----|-----|
| | アービタックス | div | 初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ² | D1 | 1週間 |
| 対象(適応癌種) | EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | | | | |

| | 薬品名【投与量】 | 投与方法 | 投与速度 | 標準投与量 | 計算量 | 投与日 |
|-----|---|---------------------|--|---|---|-----|
| Rp1 | デキサート 6.6mg(適宜増減) ポララミン 1A 生食 50mL | div (ルート・三 活) | 500 mL/hr | | 初回 : mg/body 2回目以降 : mg/body | D1 |
| Rp2 | 生食 50mL | | 100 mL/hr | | | |
| Rp3 | 初回 アービタックス【 mg/body】 生食 (500- mL) = 【 mL】 ※アービタックス(100mg/20mL)の注入分(mL) の生食をあらかじめ抜き取る。 2回目以降 アービタックス【 mg/body】 生食 (250- mL) = 【 mL】 | | 250 mL/hr (初回は2時間 2回目以降は 1時間かけて) | 初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ² | | |
| Rp4 | 生食 100mL | | 100 mL/hr | | | |