

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-19 mFOLFOX6	総投与時間：約2.5時間 + 46時間
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	オキサリプラチン(L-OHP)	div	85mg/m <sup>2</sup>	D1	2週間
	レボホリナート(l-LV)		200mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU		400mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌、結腸癌の術後補助化学療法				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日		
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1		
Rp2	(側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		125 mL/hr				200 mg/m <sup>2</sup>	mg/body
Rp3	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL (Rp2と同時に)						85 mg/m <sup>2</sup>	mg/body
Rp4	5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr				400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body
Rp5	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D1-D3		