

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-20 SOX	総投与時間：約2.5時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
/	オキサリプラチン(L-OHP)	div	100mg/m ²	D1	3週間
	S-1 : D1-D14				
	1日2回、朝夕食後に服用				
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
対象(適応癌種)	①大腸癌 ②胃癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモ セーフ)	250 mL/hr	/		D1
Rp2	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		125 mL/hr	130 mg/m ²	mg/body	
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr	/		
Rp4	エスワンタイホウ(20)【 】錠/分2 (- 0 -)朝・夕食後	1日2回、朝夕食後に服用			D1-14	
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数			
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2			
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)			
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2			