

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

| | | |
|-------------|---------------|---------------------|
| 治療レジメン名： | 大腸-22 FOLFIRI | 総投与時間：約2.5時間 + 46時間 |
| 申請医：木場 崇剛Dr | 催吐性リスク：中等度 | 最新登録日：2021年 8月 |

| | 薬剤名 | 投与方法 | 投与量 | 投与日 | クール |
|----------|----------------|---------|-----------------------|------|-----|
| | イリノテカン(CPT-11) | div | 150mg/m ² | D1 | 2週間 |
| | レボホリナート(I-LV) | | 200mg/m ² | | |
| | 5-FU | | 400mg/m ² | | |
| | 5-FU | 46hr ci | 2400mg/m ² | D1-3 | |
| 対象(適応癌種) | 治癒切除不能・再発大腸癌 | | | | |

| | 薬品名【投与量】 | 投与方法 | 投与速度 | 標準投与量 | 計算量 | 投与日 |
|-----|--|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| Rp1 | デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖液 100mL | div (ケモセーフ) | 250 mL/hr | | | D1 |
| Rp2 | イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL | | 125 mL/hr | | | |
| Rp3 | (側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL Rp2と同時に | | | 200 mg/m ² | mg/body | |
| Rp4 | 5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL | | | 500 mL/hr | 400 mg/m ² | |
| Rp5 | 5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用) | ci | 46hr | 2400 mg/m ² | mg/body | |