

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-23 IRIS	総投与時間：約2時間
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	イリノテカン(CPT-11)	div	125mg/m ²	D1,15	4週間
	S-1 : D1-D14				
	1日2回、朝夕食後に服用				
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2			
1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)			
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2			
対象(適応癌種)	大腸癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日		
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモ セーフ)	250 mL/hr			D1,15		
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL		330 mL/hr				125 mg/m ²	mg/body
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr					
Rp4	エスワンタイホウ(20)【 錠/分2 (- 0 -) 朝・夕食後 ※D1のTS-1は当日の夕食後より服用	1日2回、朝夕食後に服用			D1-14			
		体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数				
		1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2				
		1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)				
		1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2				