

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-15 アバスチン + PAC	総投与時間：約100-200分
申請医：山田 忠明Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	パクリタキセル(PAC)	div	90mg/m ²	D1,8,15	4週間
	アバスチン		10mg/kg	D1,15	2週間
対象(適応癌種)	手術不能又は再発乳癌				

アバスチン・パクリタキセル併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 使用)	500 mL/hr			D1,15
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	90 mg/m ²	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp5	アバスチン【 mg】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	10 mg/kg	mg/body	
Rp6	生食 50mL		500 mL/hr			

パクリタキセル単独投与時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 使用)	500 mL/hr			D8
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	90 mg/m ²	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			

アバスチン + PAC