

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-33 GT	総投与時間：約0.7～4.2時間
申請医：山田 忠明Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン(GEM)	div	1250mg/m ²	D1,8	3週間
	パクリタキセル(PAC)		175mg/m ²	D1	
対象(適応癌種)	手術不能又は再発乳癌				

ゲムシタビン・パクリタキセル併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 5%ブドウ糖液 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	500 mL/hr			D1
Rp2	5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖液 500mL		167 mL/hr	175 mg/m ²	mg/body	
Rp4	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr	1250 mg/m ²	mg/body	
Rp5	5%ブドウ糖液 50mL		500 mL/hr			

ゲムシタビン単独時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度 mL/hr	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜増減) 5%ブドウ糖液 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖液 50mL		500 mL/hr			