

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	卵巣-2 アバスチン + GEM/CBDCA	総投与時間：約2.5～3.5時間
申請医：山田 忠明Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバスチン	div	15mg/kg	D1	3週間
	ゲムシタビン(GEM)		1000mg/m ²	D1,8	
	カルボプラチン(CBDCA)		AUC=4	D1	
対象(適応癌種)	卵巣癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr			
Rp5	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		250 mL/hr	AUC=4	mg/body	
Rp6	5%ブドウ糖液 50mL		500 mL/hr			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	5%ブドウ糖 50mL デキサート 6.6mg	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

アバスチン + GEM/CBDCA