

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	卵巣-13 ハイカムチン	総投与時間：約1時間
申請医：鈴木 千晶Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2022年 1月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハイカムチン	div	1.5mg/m ²	D1,2,3,4,5	3週間
対象(適応癌種)	がん化学療法後に増悪した卵巣癌				
コメント	サルベージ療法のため患者の全身状態をみながら継続する。				

治療予定期間：	年	月	日	より	の間	薬剤師	薬剤師
処方医師：	適応癌種：						
患者ID：	年齢：	備考：			身長： cm	体表面積：	
患者氏名：					体重： kg	m ²	

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日						
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜増減) 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"> </td> </tr> <tr> <td>1.5 mg/m²</td> <td>mg/body</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;"> </td> </tr> </table>				1.5 mg/m ²	mg/body			D1,2,3,4,5
1.5 mg/m ²	mg/body											
Rp2	ハイカムチン【 mg/body】 生食 100mL	200 mL/hr										
Rp3	生食 50mL	500 mL/hr										

ハイカムチン