

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	子宮-4 AP	総投与時間：約4.8時間
申請医：竹内 伸司Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ドキシソルビン(DXR)	div	60mg/m ²	D1	3週間
	シスプラチン(CDDP)		50mg/m ²		
対象(適応癌種)	子宮体がん				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A マグネゾール 0.5A ソルデム3A 500mL アプレピタント使用	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1
Rp2	5%ブドウ糖液 50mL					
Rp3	ドキシソルビン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr	60 mg/m ²	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖液 50mL					
Rp5	マンニトール 300mL					
Rp6	シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)		500 mL/hr	50 mg/m ²	mg/body	
Rp7	生食 500mL					
Rp8	ソルデム3A 500mL					
Rp9	プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL					