

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	AML-1 IDR + Ara-C	総投与時間：
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	キロサイド(Ara-C)	24hr ci	100mg/m ²	D1-7	通常 1コース
	イダマイシン(IDR)	div	12mg/m ²	D1-3	
対象(適応癌種)	急性白血病(M3を除く)の寛解導入療法				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	(側管) キロサイド【 mg】 ソルデム1 500mL	24hr ci	21 mL/hr	100 mg/m ²	mg/body	D1-7
Rp2	(側管) イダマイシン【 mg】 溶解用注射用水【 mL】 生食 100mL	div	200 mL/hr	12 mg/m ²	mg/body	D1-3
Rp3	(側管) 生食 50mL(イダマイシン後フラッシュ 用)		500 mL/hr	D1-7		
Rp4	(側管) アプレピタント使用 グラニセトロン 1A 1日2回 朝、夕 (適宜減量) 生食 100mL		200 mL/hr			
Rp5	(本管) メイロン7% 2A 8時間毎 ソルデム3A 500mL (適宜減量)		68 mL/hr	D1-7		
Rp6	(側管) ラシックス 1A(適宜減量)	iv				