

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-17 GEM	総投与時間：約40分
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン(GEM)	div	①1000mg/m ²	D1,8,15	4週間
			②1250mg/m ²	D1,8	3週間
対象(適応癌種)	①非小細胞肺癌、膵癌、胆道癌、尿路上皮癌、 がん化学療法後に増悪した卵巣癌、悪性リンパ腫 ②手術不能又は再発乳癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜増減) 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			①D1,8,15 ②D1,8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			