

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	胃-13 S-1/CDDP	総投与時間：約5.5時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
S-1 : D1-D21	1日2回、朝夕食後に服用			5週間
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数	
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2	
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)	
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
シスプラチン(CDDP)	div	60mg/m ²	D8	
対象(適応癌種)	進行再発胃癌			

薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1 デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A マグネゾール 0.5A ソルデム3A 500mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr	[Shaded]		D8
Rp2 マンニトール 300mL					
Rp3 シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)					
Rp4 生食 500mL			[Shaded]		
Rp5 ソルデム3A 500mL					
Rp6 プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL					
Rp7 エスワンタイホウ(20)【 錠/分2】 (- 0 -) 朝・夕食後			1日2回、朝夕食後に服用		
体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数			
1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2			
1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)			
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2			