

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	脳腫瘍-2 アバスチン + テモダール	総投与時間：約30分～1時間半
申請医：黒田 英一Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバスチン	div	10mg/kg	D1,15	4週間
	テモダール	p.o or div	150mg/m ² or 200mg/m ²	D1-5	
対象(適応癌種)	悪性神経膠腫				

テモダール経口投与時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ルート三 活)	500 mL/hr	10mg/kg		D1,15
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp7	グラニセトロンゼリー使用(5日間) テモダール(20)【 Cap/分1 テモダール(100)【 Cap/分1	p.o		150mg/m ² or 200mg/m ²	mg/body	D1-5

テモダール点滴投与時

Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1-5
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	10mg/kg	mg/body	D1,15
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	テモダール【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 250mL) ※生食250mLからテモダールの必要量と同じ生食を抜き取る。 ※1バイアル(100mg)当たり注射用水41mLで調製する(テモダール2.5mg/mL)。		167 mL/hr	150mg/m ² or 200mg/m ²	mg/body	D1-5
Rp5	生食 50mL		500 mL/hr			