

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	膀胱-2 GC	総投与時間：約45分-約5.5時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン(GEM)	div	1000mg/m ²	D1,8,15	4週間
	シスプラチン(CDDP)		70mg/m ²	D2	
対象(適応癌種)	尿路上皮癌				

ゲムシタビン施行時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日		
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜増減) 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1,8,15		
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr				1000 mg/m ²	mg/body
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr					

シスプラチン施行時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A メイロン 0.5A ソルデム3A 500mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D2
Rp2	マンニトール 300mL					
Rp3	シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)					
Rp4	生食 500mL					
Rp5	ソルデム3A 500mL					
Rp6	プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL					