

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	MM-1 ベルケイド	総投与時間：約6時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ベルケイド	i.v または s.c	1.3mg/m <sup>2</sup>	D1,4,8,11	3週間
				(8クール後) D1,8,15,22	5週間
対象(適応癌種)	再発又は難治性の多発性骨髄腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL	div	90 mL/hr			D1,4,8,11
Rp2	<静注で施行する場合> ベルケイド注【           mg/body】 溶解用生食【           mL】 ※生食20mLより1Vにつき3mLで溶解 フラッシュ用生食 20mL	iv	ワンショット	1.3 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
	<皮下投与で施行する場合> ベルケイド注【           mg/body】 溶解用生食【           mL】 ※生食20mLより1Vにつき1.2mLで溶解	s.c	ゆっくりと			
Rp3	(必要時) デキサート【           mg/body】 生食 100mL	div	200 mL/hr			適宜