

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

| | | |
|-------------|----------------------|----------------|
| 治療レジメン名： | MM-5 modified-CyBorD | 総投与時間：皮下注または静注 |
| 申請医：青島 敬二Dr | 催吐性リスク：中等度 | 最新登録日：2021年 8月 |

| | 薬剤名 | 投与方法 | 投与量 | 投与日 | クール |
|----------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----|
| | ベルケイド | i.v または s.c | 1.3mg/m ² | D1,8,15,22 | 5週間 |
| | エンドキサン(CPA) | p.o | 300mg/m ² | D1,8,15,22 | |
| | レナデックス(DEX) | | 40mg/body | D1-4, 9-12,17-20 | |
| 対象(適応癌種) | 多発性骨髄腫 | | | | |

| | 薬品名【投与量】 | 投与方法 | 投与速度 | 標準投与量 | 計算量 | 投与日 |
|-----|--|------|--------|--------------------------|---------|---------------------|
| Rp1 | <静注で施行する場合> ベルケイド注【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき3mLで溶解 フラッシュ用生食 20mL | iv | ワンショット | 1.3 mg/m ² | | D1,8,15,22 |
| | <皮下投与で施行する場合> ベルケイド注【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき1.2mLで溶解 | | | | | |
| Rp2 | エンドキサン(50)【 】T/朝・夕食後 | p.o | | 300mg/m ² | mg/body | D1,8,15,22 |
| Rp3 | レナデックス(4)【 】T/空腹時を避けて | | | 40mg/body | mg/body | D1-4, 9-12,17-20 |