

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-9 CVP	総投与時間：約16時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	エンドキサン(CPA)	div	750mg/m <sup>2</sup>	D1	3-4 週間
	オンコビン(VCR)		1.4mg/m <sup>2</sup> (MAX 2mg/bodyまで)		
	プレドニン(PSL)	p.o	60mg/m <sup>2</sup> または 100mg/body	D1-5	
対象(適応癌種)	非ホジキンリンパ腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	エンドキサン【mg/body】 生食 500mL	div	170 mL/hr	750 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D1
Rp2	オンコビン【mg/body】 生食 50mL		100 mL/hr	1.4 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	生食 50mL(オンコビン後フラッシュ用)		500 mL/hr			
Rp4	メイロン7% 2A 8時間毎 ソルデム1 500mL (適宜減量)		68 mL/hr			
Rp5	グラニセトロン 1A 1日2回 朝、夕 生食 100mL (適宜減量)		200 mL/hr			
Rp6	ラシックス 1A	iv				
Rp7	プレドニン(5)【】T/分2( - - 0 ) 朝・昼食後	p.o		60mg/m <sup>2</sup> または 100mg/body	mg/body	D1-5